Доврачебная помощь при неотложных и экстремальных состояниях

1. Отметьте верные действия при ранении конечности:

1. Следует обработать рану спиртовым раствором
2. Необходимо рану промыть, закрыть салфеткой. Закрепить салфетку с помощью бинта или лейкопластыря.
3. Следует промыть рану водой
4. Необходимо рану полностью накрыть чистой салфеткой. Закрепить салфетку с помощью бинта или лейкопластыря;

Правильный ответ: Необходимо рану полностью накрыть чистой салфеткой. Закрепить салфетку с помощью бинта или лейкопластыря;

2. Отметьте верные действия при артериальном кровотечении:

1. Жгут может быть наложен не более чем на 40 мин
2. Повременную артерию сдавить пальцами или кулаком, стараясь прекратить поток проходящей по ней крови;
3. Высвободить конечности от одежды, придавить артерию, наложить кровоостанавливающий жгут
4. После экстренного прижатия поврежденной артерии, необходимо продолжить временную остановку крови с помощью жгута;

Правильный ответ: Повременную артерию сдавить пальцами или кулаком, стараясь прекратить поток проходящей по ней крови;; После экстренного прижатия поврежденной артерии, необходимо продолжить временную остановку крови с помощью жгута;

3. Отметьте верные действия при оказании помощи в случае перелома конечностей

1. В случае открытого перелома в первую очередь наложите шину, а следом повязку;
2. Охладите место травмы. Приложите лед или холод на повременное место;
3. Рекомендуется давать пострадавшему алкоголь с целью «обезболить».

Правильный ответ: Охладите место травмы. Приложите лед или холод на повременное место;

4. Отметьте верные действия при оказании помощи - искусственное дыхание:

1. Пять раз надавливаем на грудину затем два вдоха искусственного дыхания, приподнять ноги пострадавшего;
2. Десять раз надавливаем на грудину затем два вдоха искусственного дыхания, поднять ноги пострадавшего, к голове приложить холод, реанимацию проводить до прибытия медперсонала;
3. Все ответы верны.
4. Пятнадцать раз надавливаем на грудину затем два вдоха искусственного дыхания, приподнять ноги пострадавшего, к голове приложить холод, реанимацию проводить до прибытия медперсонала;

Правильный ответ: Пятнадцать раз надавливаем на грудину затем два вдоха искусственного дыхания, приподнять ноги пострадавшего, к голове приложить холод, реанимацию проводить до прибытия медперсонала;

5. Отметьте в каких случаях требуется наложить шину на конечность:

1. Если пострадавший жалуется на боль;
2. Визуализируются обломки костей;
3. Если есть подозрение, что поврежден позвоночник;
4. Видны деформации и отеки на конечностях;

Правильный ответ: Если пострадавший жалуется на боль;; Визуализируются обломки костей;; Если есть подозрение, что поврежден позвоночник;

6. Отметьте верные действия при оказании помощи - искусственное дыхание, при устранении воздуха из желудка:

1. Не поворачивая, ослабить ремень, поднять ноги для полного выхода воздуха
2. Необходимо повернуть пострадавшего на живот нажать кулаками пониже пупка;
3. Все варианты можно применять
4. Необходимо поднять ноги пострадавшего, надавить ладонями на грудину;

Правильный ответ: Необходимо повернуть пострадавшего на живот нажать кулаками пониже пупка;

7. В случае проникающей раны в живот:

1. Пострадавшему необходимо ввести обезболивающий препарат и дать антибиотики;
2. Необходимо дать обильное питье;
3. Попытаться вправить выпавшие органы, накройте содержимое раны чистой салфеткой и прикрепите ее пластырем. Поднимите ноги и отстегните поясной ремень.
4. Накройте рану чистой тканью и прикрепите ее пластырем. Поднимите ноги и отстегните поясной ремень.

Правильный ответ: Пострадавшему необходимо ввести обезболивающий препарат и дать антибиотики;; Накройте рану чистой тканью и прикрепите ее пластырем. Поднимите ноги и отстегните поясной ремень.

8. Что относится к признакам обморока:

1. Кратковременная потеря сознания (не более 7-10 мин);
2. сонливость;
3. Перед потерей сознания имелись жалобы на сильную слабость, звон в ушах и головокружение;
4. падение давления;

Правильный ответ: сонливость;; Перед потерей сознания имелись жалобы на сильную слабость, звон в ушах и головокружение;; падение давления;

9. Отметьте верные действия при охлаждении:

1. Снять с пострадавшего одежду, поместить в воду (t воды 35-40 гр.);
2. Дать пострадавшему теплое сладкое питье;
3. Снять с пострадавшего одежду, поместить в воду (t воды 25-35 гр.);
4. Дать 50 мл алкоголя и переместить в теплое место

Правильный ответ: Снять с пострадавшего одежду, поместить в воду (t воды 35-40 гр.);; Дать пострадавшему теплое сладкое питье;

10. Отметьте верные действия при проникающем ранении:

1. Не прикасаться к ране, не мыть, не удалять из нее инородные тела Транспортировка должна производится исключительно в положении
2. Зажать поврежденный сосуд или сильно изогнуть конечность или наложить жгут;
3. Нет верных ответов

Правильный ответ: Не прикасаться к ране, не мыть, не удалять из нее инородные тела Транспортировка должна производится исключительно в положении; Зажать поврежденный сосуд или сильно изогнуть конечность или наложить жгут;