Общая характеристика соматического и психического статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

1. Укажите место расположения тактильных рецепторов:

1. В сосудистых сплетениях кожи;
2. Располагаются в виде специальных телец в кожных сосудах, в виде специализированных дисков на кончиках пальцев, в виде спирали нервного волокна сенсорной клетки в волосяном мешочке;
3. В окончаниях волос.
4. В полых органах;

Правильный ответ: Располагаются в виде специальных телец в кожных сосудах, в виде специализированных дисков на кончиках пальцев, в виде спирали нервного волокна сенсорной клетки в волосяном мешочке;

2. Врожденная слепота приводит:

1. Высокой степени чувствительности обонятельных рецепторов.
2. Трудности в освоении пространства и предметной деятельности;
3. Затруднениям в установлении вертикального положения тела;
4. Трудностям определения цвета на ощупь;

Правильный ответ: Трудностям определения цвета на ощупь;

3. Кохлеарная имплантация проводится на уровне:

1. Коры головного мозга;
2. Среднего уха;
3. Внутреннего уха;
4. Барабанной перепонки.

Правильный ответ: Внутреннего уха;

4. Назовите место локализации участков коры головного мозга, в которых расположены слуховые и зрительные центры.

1. В коре предцентральной извилины;
2. В коре височной доли и затылочной доли;
3. В лимбической системе;
4. В участках теменных долей.

Правильный ответ: В коре височной доли и затылочной доли;

5. Благодаря чему происходит процесс «аккомодации глаз»?

1. Вторичная фотореакция фоторецепторов;
2. Изменение диаметра зрачка;
3. Изменение объема стекловидного тела;
4. Дивергенция глаз.

Правильный ответ: Изменение диаметра зрачка;

6. Нарушения мелкой моторики рук наиболее характерно для:

1. Эпилепсии;
2. Нарушений зрения;
3. Детского церебрального паралича;
4. Нарушений слуха.

Правильный ответ: Детского церебрального паралича;

7. Приобретённые нарушения слуха связаны:

1. С перенесенными воспалительными процессами слухового анализатора после рождения;
2. Все ответы верны.
3. С генетическими факторами;
4. С перенесенными психотравмирующими событиями;

Правильный ответ: С перенесенными воспалительными процессами слухового анализатора после рождения;

8. Определите признаки, свидетельствующие о наличии гиперметропии:

1. Выраженное отклонение головы при написании текста;
2. Старание приблизить глаза к тексту;
3. Прищуривание при рассмотрении удаленных предметов.
4. Удаление от текста при рассматривании;

Правильный ответ: Удаление от текста при рассматривании;

9. Укажите наиболее вероятную причину (фактор) риска нарушения интеллекта:

1. Рождение близнецов (наличие близнеца);
2. Психические травмы, перенесенные в раннем детстве;
3. Гипоопека;
4. Органические поражения нервной системы (энцефалиты, эпилепсия и др.).

Правильный ответ: Органические поражения нервной системы (энцефалиты, эпилепсия и др.).

10. Нарушения речи наиболее часто встречаются у обучающихся страдающих:

1. Детским церебральным параличом;
2. Астереогнозом.
3. Аутизмом;
4. Зрительными агнозиями;

Правильный ответ: Детским церебральным параличом;

11. К основным причинам развития миопии относятся:

1. Черепно-мозговые травмы;
2. Атрофия зрительного нерва;
3. Помутнение хрусталика;
4. Патология склеры и формы глазного яблока.

Правильный ответ: Патология склеры и формы глазного яблока.

12. Нарушения интеллекта наиболее характерно:

1. Для категории лиц, страдающих логоневрозом;
2. Для гемофилии.
3. Для синдрома Клайнфельтера;
4. Для синдрома Дауна;

Правильный ответ: Для синдрома Клайнфельтера;

13. К периферическому отделу зрительного анализатора относится:

1. Затылочная доля коры;
2. Зрительный нерв;
3. Парагиппокампова извилина;
4. Лобные доли головного мозга.

Правильный ответ: Зрительный нерв;

14. Астереогнозом называется:

1. Поражение преддверно-улиткового нерва;
2. Неузнавание предметов на ощупь с закрытыми глазами;
3. Невозможность запоминания визуальных символов.
4. Нарушение зрительного восприятия;

Правильный ответ: Неузнавание предметов на ощупь с закрытыми глазами;

15. Назовите симптомы спастической диплегии:

1. Нарушения движения глаз;
2. Нарушения мелкой моторики кистей рук.
3. Нарушения подвижности и чувствительности нижних конечностей;
4. Неузнавание предметов на ощупь;

Правильный ответ: Нарушения подвижности и чувствительности нижних конечностей;

16. Основными причинами агнозий являются:

1. Поражение зрительного тракта.
2. Повышение внутричерепного давления;
3. Поражение сенсорных участков коры головного мозга;
4. Поражение периферической части нервной системы;

Правильный ответ: Поражение сенсорных участков коры головного мозга;

17. Страдающий «аутизмом» подопечный наибольшие трудности испытывает:

1. Узнавании близких и родственников;
2. Решении математических задач;
3. Социальной адаптации;
4. Нарушении зрительно-пространственного синтеза.

Правильный ответ: Социальной адаптации;

18. Зрительно-пространственная форма агнозии выражена:

1. Отсутствием понимания значения предлогов.
2. В потере памяти на места пребывания;
3. Отсутствием возможности определения цвета предметов;
4. Невозможностью определения и вербального выражения пространственного положения предметов друг по отношению к другу;

Правильный ответ: Невозможностью определения и вербального выражения пространственного положения предметов друг по отношению к другу;

19. Наиболее часто встречающимся симтомом при «аутизме» является:

1. Повышенная возбудимость.
2. Трудности привлечения внимания и рефлексов сосредоточения на объекте;
3. Параличи и парезы;
4. Амнезии;

Правильный ответ: Трудности привлечения внимания и рефлексов сосредоточения на объекте;

20. Корректировка двигательных навыков у обучающихся, страдающих детским церебральным параличом наиболее эффективна:

1. При применении лечебной физкультуры и массажа.
2. При использовании силовых упражнений;
3. При оперативном вмешательстве на головном мозге;
4. При использовании седативных препаратов;

Правильный ответ: При применении лечебной физкультуры и массажа.